TINES KLINIK
v/ Tine Tetzschner
speciallæge i gynækologi og obstetrik, Phd.
Axeltorv 8, 5. sal., 1609 København V - tlf. 33 33 95 15 - www.tinesklinik.dk

UDSKRABNING

Gynækologisk udskrabning



En livmoder har form og størrelse som en pære. Den runde del kaldes for livmoderhulen, mens den smalle del af "pæren" kaldes for livmoderhalsen. Selve livmodervæggen består af et meget tykt lag muskler, som inderst er beklædt med en slimhinde.

Hos kvinder i den fødedygtige alder opbygges slimhinden i livmoderhulen hver måned i forbindelse med ægløsningen. Bliver ægget ikke befrugtet, går det nye slimhindelag til grunde og udstødes fra livmoderen sammen med det det ubefrugtede æg ved en menstruation

Normalt er menstruationen regelmæssig, hvor du bløder i 3-7 dage hver måned, efterfulgt af 21-25 blødningsfrie dage.

Hvis dit blødningsmønster ændrer sig, kan det enten skyldes hormonforstyrrelser, en godartet eller ondartet lidelse på livmoderhalsen eller inde i selve livmoderhulen.

For at kunne stille en korrekt diagnose, udtages væv fra slimhinden og sendes til en mikroskopiundersøgelse for eventuelle sygelige forandringer.

Derfor sker det jævnligt, at kvinder med blødningsforstyrrelser får foretaget en udskrabning. Det gælder særligt kvinder, som begynder at bløde igen efter overgangsalderen.

Konsultation før en eventuel udskrabning

Ved konsultationen bliver du bedt om at beskrive dine symptomer.

Herefter foretages en gynækologisk undersøgelse samt en vaginal ultralydsscanning. I nogle tilfælde kan man alene ud fra disse undersøgelser stille en diagnose.

Udskrabningen - som foregår i lokalbedøvelse



Undersøgelsen foregår som ved en gynækologisk undersøgelse. Med en tynd nål, lægges der lokalbedøvelse i livmoderhalsen.

Herefter føres en tyndt kateter med sug gennem skeden op i livmoderhulen.

Med kateteret suges og skrabes lidt væv ud, som sendes til mikroskopiundersøgelse. Indgrebet varer ca. 10 min., men selve prøvetagningen varer ikke mere end 1-2 min.

Hos nogle patienter kan der forekomme menstruationslignende smerter under selve prøvetagningen og ved selve lokalbedøvelsen af livmoderhalsen, kan du mærke et lille stik.

Efter undersøgelsen

Det er normalt, at du pletbløder i dagene efter en udskrabning. Hvis du begynder at bløde som ved en kraftig menstruation, får smerter eller feber, skal du kontakte klinikken i dagtimerne eller vagtlæge uden for vor åbningstid.

Svar på undersøgelsen

Du skal regne med at der går 1-2 uger, inden svaret på vævsprøverne foreligger.

Ved konsultationen aftaler vi om du ønsker svar pr. telefon eller på e-mail (via ehr). Hvis du vælger at få svar på e-mail, skal du huske at bekræfte at du har modtaget svaret.