



Kondylomer

Patientvejledning

Kondylomer er kønsvorter, som skyldes smitte med humant papillom virus, også kaldet HPV. En kvindes livstids risiko for at få kondylomer er ca. 10 %, hvis man ikke er vaccineret.

Hvordan smitter kondylomer?

Kondylomer smitter ved direkte kontakt, f. eks. ved samleje, hvor der overføres vortevirus.

Symptomer:

Kondylomer giver irritation, kløe, svie og kosmetiske gener på skamlæber, skede, mellemkød og omkring og i endetarmen. Kondylomer er fligede, blomkålslignende, flade, lyserøde eller hvide.

Hvordan stilles diagnosen:

Ofte kan det ses direkte. I tvivlstilfælde kan lægen bruge en speciel kikkert eller tage en biopsi dvs. vævsprøve.

Behandling

Lokal behandling:

Kønsvorter kan behandles, men det kan tage flere måneder.

Medicinsk behandling:

Codyline og Wartec:

Påsmøres vorterne. Bruges x 2 dagligt i tre dage. Det gentages hver uge i op til 3 måneder. Tilbagefald ses hos 16-34 %. Behandlingen udføres oftest af patienten selv.

Aldara:

Påsmøres x 1 dagligt ved sengetid 3-5 gange ugentligt og afvaskes om morgenen, højst i 16 uger. Tilbagefald ses her hos 13-19 %. Behandlingen udføres oftest af patienten selv. Må ikke anvendes til gravide

Podofyllin:

Påsmøres af lægen 1-2 gange ugentligt i op til 6 uger. Skal afvaskes i starten 1-9 timer efter påsmøring. Tilbagefald ses hos 21-45 %. Må ikke anvendes til gravide. Aldara påsmøres x 1 dagligt ved sengetid 3-5 gange ugentligt og afvaskes om morgenen, højst i 16 uger. Tilbagefald ses her hos 13-19 %. Må ikke bruges til gravide. Alle former for lokalbehandling har bivirkninger. Det er vigtigt at behandlingen ikke gør det værre end selve kondylomerne. Ved lokalbehandling kan der ses rødme, svie, kløe, sår- og ardannelse som kan være så udtalt, at behandlingen må indstilles.

Anden behandling:

Foretages hos læge eller på hospital:

Kirurgisk operation:

Dvs fjernelse af kondylomerne i lokal bedøvelse.

Laserbehandling:

Foregår på hospital i fuldbedøvelse og anvendes hvis antallet af kondylomer er meget stort.

Kryobehandling eller frysebehandling:

Frysning ca. hver anden uge i op til 2-4 måneder.

Bivirkninger ved behandlingerne:

Der kan ses blødning, betændelse og arvævs dannelse ved disse former for behandling. Disse metoder kan anvendes af gravide.

Kontrol og vaccination:

Da der er tilbagefald hos 10-50 %, anbefales kontrol efter cirka 3 måneder. Kønsvorter kan næsten forebygges 100 % ved vaccination mod HPV type 6 og 11, som findes i vaccinen Gardasil.

Partnerbehandling:

Din partner skal behandles hvis der er synlige kondylomer. Det er vigtigt at bruge kondom til I begge er fri for kondylomer. Din nuværende partner behøver ikke at være dén, som har smittet dig, og selve smittebæreren behøver ikke at have haft synlige kønsvorter.

Læs mere på:

www.netdoktor.dk

www.sundhed.dk